Gestion des plantes exotiques envahissantes en milieu aquatique - Quelles autres approches que l'arrachage manuel?



Arnaud MontyMarie Patinet





Dido Gosse



Etienne Branquart





The RIPARIAS project has received funding from the LIFE Programme of the European Union



Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species

« A travers le projet LIFE RIPARIAS, les autorités belges s'associent afin d'optimiser la gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de rivières et dans les étangs par-delà les frontières régionales.

Ce projet est rendu possible grâce au cofinancement de l'Union européenne dans le cadre du programme LIFE ».

COORDINATEUR





PARTENAIRES








































ManalAS













Revue complete de la literature scientifique (SCOPUS)

→ 358 documents (espèce x technique)

Revue de la literature "grise" (CABI, IUCN, LIFE, ONEMA, guides techniques, etc.)

 \rightarrow 90+ documents



Synthèse

- → Eradication efficace
- → Contrôle efficace
- → Inefficace




Revue complete de la literature scientifique (SCOPUS)

→ 358 documents (espèce x technique)

Revue de la literature "grise" (CABI, IUCN, LIFE, ONEMA, guides techniques, etc.)

→ 90+ documents



Synthèse

- → Eradication efficace
- → Contrôle efficace
- → Inefficace

Discussion avec des experts

- → Efficacité "locale" (éradication > contrôle)
- → Faisabilité
- → Acceptabilité



Revue complete de la literature scientifique (SCOPUS)

→ 358 documents (espèce x technique)

Revue de la literature "grise" (CABI, IUCN, LIFE, ONEMA, guides techniques, etc.)

 \rightarrow 90+ documents



Synthèse

- → Eradication efficace
- → Contrôle efficace
- → Inefficace

Discussion avec des experts

- → Efficacité "locale" (éradication > contrôle)
- → Faisabilité
- → Acceptabilité



Bonnes pratiques de gestion





Revue complete de la literature scientifique (SCOPUS)

→ 358 documents (espèce x technique)

Revue de la literature "grise" (CABI, IUCN, LIFE, ONEMA, guides techniques, etc.)

→ 90+ documents



Synthèse

- → Eradication efficace
- → Contrôle efficace
- → Inefficace

Discussion avec des experts

- → Efficacité "locale" (éradication > contrôle)
- → Faisabilité
- Acceptabilité



Bonnes pratiques de gestion

- Efficace
- Faisable
- Acceptable légalement
- Acceptable sociétalement
 - Acceptable environnementalement


















ARRACHAGE MANUEL

ARRACHAGE MANUEL


- ▼ Très polyvalent
- **Efficace**
- Peu impactant pour le milieu et les services écosystémiques:





ARRACHAGE MANUEL

- ▼ Très polyvalent
- **▼** Efficace
- Peu impactant pour le milieu et les services écosystémiques:





- X Fastidieux en cas de fortes invasions
- Travail pénible dans certaines conditions
- Problèmes d'accès ou de sécurité?







MÉTHODES ALTERNATIVES OU COMPLÉMENTAIRES























ARRACHAGE MÉCANIQUE








- Grands volumes, grandes surfaces
- Difficultés pour les opérateurs

Gestion mécanique: engins terrestres





Gestion mécanique : engins terrestres



- √ Contrôle efficace avant potentielle éradication
- ✓ Situations de fortes invasions





- Ensemble de la zone accessible aux machines?
- ☑ Création de fragments et risque de propagation



QUELLES ESPECES?



Ludwigia spp.



Hydrocotyle ranunculoides

La méthode – principe général





Il existe différents modes de valorisation possible des déchets issus de la gestion.

- ➤ Compostage
- > Enfouissement
- > Séchage
- > Incinération



La méthode – principe général






Tenir compte de la biologie de l'espèce est essentiel pour le choix du timing de la gestion

> Pour la jussie, l'arrachage prend place avant la fructification

La méthode – principe général





La pose de filets à mailles fines est indispensable pour empêcher la dispersion de fragments



Exemple d'application: arrachage mécanique - engins terrestres

Hydrocotyle ranuncoloides: Grez-Doiceau - Belgique



Eradication



Eradication



Cours d'eau - 2,4 km



Cout total: 610 heures.homme




Début: 2015: arrachage mécanique

Fin: 2016 -2020 arrachage manuel en suivi





Gestion mécanique: engins flottants



Gestion mécanique : engins flottants



- ✓ Possible sur grand plans d'eau
- √ Situations de fortes invasions





- Méthode peu sélective et onéreuse
- Impacts potentiels sur les communautés de poissons





QUELLES ESPECES?

Ludwigia spp





Lagarosiphon major





Cabomba caroliniana

Myriophyllum heterophyllum



Hydrocotyle ranunculoides

Le bateau-râteau



1

Le râteau ratisse le fond du plan d'eau jusqu'à une profondeur de 10 à 15 cm.

2

Le godet à déversement à mailles fines est utilisé pour collecter le matériel végétal déraciné et le déverser sur la berge

Le modèle de dents du râteau choisi en fonction du type de substrat et l'espèce ciblée.

Exemple d'application: arrachage mécanique - engins flottants

Myriophyllum heterophyllum: Oranjekanaal, Pays-Bas



Eradication



Très bon contrôle

Possible éradication dans plusieurs années



Canal – +/- 500m



Cout total: pas de donnée



Début: 2021 - 8 passages 1x/mois


Fin: 2022 - plantes en berge (manuel)


NB: entretien 1X par an avec harkboot






PRIVATION DE LUMIÈRE





- Difficulté d'arrachage complet
- Profondeur/vase importante
- Plans d'eau fort envahis
- Berges colonisées

Privation de lumière : couverture benthique en toile de jute



Privation de lumière : couverture benthique en toile de jute



- Eradication ou contrôle efficace
- √ Grandes surfaces possibles
- √ Toile de jute = résistant, biodégradable, coût limité
- ✓ Développement de la végétation indigène





- Pose limitée aux eaux stagnantes sans obstacles
- Besoin de plongeurs



QUELLES ESPECES?



major








Cabomba caroliniana

Myriophyllum heterophyllum


Myriophyllum aquaticum





La lumière ne doit pas atteindre la plante depuis des ouvertures ou les abords de la couverture.


- > Couvertures se chevauchant correctement.
- ➤ Privilégier les bandes de jute de grande dimension






Importance de veiller à ce qu'aucun fragment ne persiste.

> Risque élevé que de nouvelles plantes ne poussent sur la toile de jute.





La couverture doit être bien fixée au moyen de poids lourds





La méthode peut être réalisée hors saison de végétation

La méthode – matériel









Des matériaux non-biodégradables en plastique ou fibre de verre sont parfois utilisés...

- Si non-perméable, les gaz peuvent s'accumuler
- Doit être retiré au bout de quelques mois ou années
- Impact plus élevé sur la faune et la végétation

Exemple d'application: couverture benthique en toile de jute

Lagarosiphon major: Lough Corrib, Irelande



Eradication



Eradication atteinte




Une zone de 1725 m² infestée et couverte de jute



Jute:150 Euro/100 m²




Début: Aout 2008 Fin: Octobre 2009







Privation de lumière : couverture flottante



Privation de lumière : couverture flottante



- ✓ Eradication ou contrôle efficace
- √ Moins sensible aux obstacles





- Populations limitées et petits plans d'eau
- Méthode non sélective
- Danger éventuel



Exemple d'application: couverture flottante

Cabomba caroliniana: Kin Kin - Queensland, Australie



Eradication



Très bon contrôle

➤ 8 mois après enlèvement : 1 patch de 1.5m de diamètre



Etang - 1400 m²



Matériel: 4228 euros

Main d'œuvre: 15.000 euros



Début: Octobre 2007


Fin: Avril 2008


NB: aucune cabomba depuis 2020





MÉTHODES « LOURDES » OU DRASTIQUES









- Espèces très difficiles à gérer
- Intervention lourde justifiée

Retrait de substrat: curage



Retrait de substrat : curage











- Méthode lourde et onéreuse
- ☑ Traitement des déchets
- Création de fragments avec risque de propagation
- Ensemble du site accessible aux machines



QUELLES ESPECES?






Myriophyllum heterophyllum



Cabomba caroliniana




Myriophyllum aquaticum






Le matériel récolté est transporté vers des centres de traitement adéquats





La privation de lumière via la pose de bâches est une méthode de suivi qui va permettre d'améliorer l'efficacité du curage





Toute intervention doit faire l'objet d'une mise en place minutieuse de mesures de précautions afin d'empêcher la dispersion de fragments

Exemple d'application: couverture benthique plastique

Cabomba caroliniana: Sint Pauwels, Belgique



Eradication



Eradication atteinte



Fossé - 1200 m²

• 1,2 m de profondeur max



Curage: 40.000 euros


Autres coûts: NA



Début: 2018

Fin: 2022


NB: aucune cabomba depuis 2020








Modification de l'écosystème





Modification de l'écosystème



- ✓ Eradication possible
- √ Résultats rapides




- ☑ Changement de l'écosystème impact potentiellement important sur la faune et la flore!
- Potentielles contraintes légales (permis d'urbanisme)



QUELLES ESPECES?







Myriophyllum aquaticum






L'écosystème-cible doit présenter un intérêt pour la faune et la flore...

- > Espèces indigènes
- Conseil d'experts
- > Approvisionnement?


... et être résistant à l'invasion.





Approche cas par cas!

- ➤ Compensation écologique ?
- > Succession écologique ?
- ➤ Restauration écologique ?



Exemple d'application: modification d'écosystème

Ludwigia grandiflora: Rendeux, Belgique



Eradication ou bon contrôle



Diminution progressive de l'espèce



Cout faible...







Les méthodes de gestion



Les méthodes de gestion



La mise en assec

- ✓ Simple et peu couteux dans certains types de plan d'eau
- ✓ Efficace pour contrôler les hydrophytes strictes
- ✓ En période hivernale, permet le gel des plantes
- √ Etape préalable de certains chantiers (curage, pose de bâches, etc.)

☑ Aléas météorologiques ?





L'utilisation de carpes herbivores stériles

- ✓ Ingénierie écologique
- Préférence pour certaines espèces
- ☑ Difficulté de se procurer les individus triploïdes...
- Espèce exotique Besoin de récupérer les individus



Ctenopharyngodon idella

Merci pour votre attention!

www.riparias.be



Guides de bonnes pratiques de gestion



Plantes exotiques envahissantes des milieux aquatiques et rivulaires - guide de bonnes pratiques de gestion



Ecrevisses exotiques envahissantes - identification et bonnes pratiques de gestion

Remerciements:

Tim Adriaens, Élodie Crépin, Bram D'hondt, Gaëtan De Baene, Adrien Delforge, Muriel Thirion, Ben Van der Wijden Le programme LIFE de l'Union Européenne





